

Caro Domingos,

Utilizamos uma dieta alimentar básica que sofre alterações em função do regime a que se destina. Relaciono os pontos mais importantes para o seu conhecimento.

- 1. Enriquecemos a dieta básica (mistura de grãos) com proteína animal (Alimento vivo e gema de ovo cozido) durante a estação de cria dos ninhengos.**
- 2. Suplementamos a dieta básica com cálcio e vitaminas durante o “Desmame” e a separação dos filhotes. Esta suplementação é feita até a conclusão da muda de ninho. (4 a 6 meses).**
- 3. Fornecemos uma dieta diversificada no período da muda. As alterações são em função da existência de muda de bico e de penas simultaneamente. As Matrizes recebem tratamento alimentar diferenciado dos machos e filhotes, são analisadas caso a caso em função do desgaste sofrido durante a estação de cria, caso de matriz que criou 06 ou mais filhotes na estação.**

A nossa mistura de sementes é constituída de:

**50% de Alpiste
10% de Painço Alemão
10% de Painço Preto
10% de Painço Vermelho
10% de Painço Verde
10% de Painço Português ou Perilla**

OBS: Esta mistura pode sofrer alterações em função da seletividade apresentada. Alteramos as proporções quando julgamos necessário.

Farinhada Caseira

01 gema de ovo de galinha cozida por 25 minutos e passada em peneira fina.

02 colheres das de sopa de Super Top-Life daalcon em pó.

01 colher de sopa de Milharina Quaker (flocos de milho pré-cozido)

1 colher de chá de Carbonato de Cálcio (casca de ovo de galinha moída de cor branca).

½ colher de café de Propionato de Cálcio. (opcional)

Larvas de Tenébrio Molitor Hidratadas

As larvas são selecionadas com tamanho máximo de 15mm e alimentadas durante o período com a seguinte mistura: Farelo de trigo, farelo de aveia, Super Toplife em pó, um pouco de Cálcio em pó e gema de ovo cozida peneirada e desidratada. Separadas de véspera na quantidade a ser usada, são distribuídas em duas refeições diárias. Colocamos de véspera para passarem a noite em vasilhame de vidro tipo Pirex contendo apenas um guardanapo de papel absorvente umedecido em uma solução de VITA GOLD POTENCIADO (Laboratório Tortuga) e água, na proporção de 20 gotas para 50ml de água efetuando-se a completa hidratação das larvas que serão servidas no dia seguinte.

**Um forte abraço,
Gilson-BA.**

Caro Domingos,

Implantamos em nosso criadouro o uso da ração extrusada por entender ser este tipo de ração o alimento ideal para os nossos pássaros.

Observamos durante 90 dias em que usamos o produto os seguintes pontos principais:

Alguns pássaros não aceitaram inclusive “Embolaram” mais não comeram. Outros com a insistência aceitaram, por falta de opção, e alguns adoraram, comeram sem restrição.

Observamos um consumo exagerado de água no período, bem como, uma intensa diarreia.

Observamos que a maioria tentava descascar a ração, sendo observado grande quantidade de pó colorido resultante do ato da descasca.

Observamos em termos comparativos que o volume de extrusado e o volume de sementes nos comedouros diferiam, consumiam mais extrusados do que sementes.

Observamos no período uma redução considerável da mobilidade, digamos, uma quietação muito grande. Sonolência.

Após a análise de todas estas questões, decidimos Por suspender o uso do extrusado.

Temerosos em relação aos possíveis resultados em curto prazo e por não dispor de garantias quanto as possíveis conseqüências pelo uso na estação de cria. Optamos por aguardar os resultados obtidos por companheiros mais determinados.

Um forte abraço,
Gilson-BA.

Gilson-BA.
Orgulho de ser