


Papa-Capim (Coleiro-Da-Bahia).

Ocorre nas áreas abertas (pastagens) situadas na **Mata Atlântica do Sul da Bahia** uma grande variedade do gênero **Sporophila** sendo que as espécies **nigricolis** e **caerulescens** têm despertado muitas atenções por parte dos aficionados desta região não só pelo seu canto, mais também pelo seu territorialismo e acima de tudo pela sua **Grande ocorrência**, estão por todas as partes.

Aquí na Bahia denominamos estas maravilhosas aves de um modo geral como sendo **“Papa-Capins”** e diferenciamos os indivíduos que compõem o grupo da seguinte forma:



A morfologia destas aves apresenta (na região em questão) um grande número de detalhes diferencias entre os indivíduos do grupo tais como:

Papa Capim de Cabeça Preta. Coleiro-Da-Bahia (Sporophila n. nigricolis).

OS MACHOS

São desprovidos de coleira podendo possuir o **Peito Branco ou Peito Amarelo** medindo aproximadamente 11 a 12 cm, sendo que destes, 5cm pertencem à cauda.

São de cor preta - A cabeça, a frente, a face, a nuca, a garganta e a parte superior do peito.

São de Cor negra-ardósia-esverdeada – O dorso, tectrizes, a cobertura da cauda, a rêmiges e a cauda.

São de cor branca nos de Peito Branco – O peito, o ventre e o uropígio.

São de cor amarela nos de Peito Amarelo – O peito, o ventre e o uropígio.

Olhos com Íris negras e bico cinza azulado nos de Peito Amarelo com Tarsos Negros.

Olhos com Íris negras e bico cinza amarelado nos de Peito Branco com Tarsos Negros.

Obs: Alguns dos indivíduos deste grupo possuem um “Espelho Branco” no centro das azas, ou apenas os insinua, no entanto encontramos um grande número completamente desprovidos de tal característica. (não as exibem).

Papa Capim de Coleira. Coleiro Virado (*Sporophila c. caerulescens*).

São dotados de coleira podendo possuir o **Peito Branco ou Peito Amarelo** medindo aproximadamente 11 a 12 cm, sendo que destes, 5cm pertencem à cauda.

1. **São de cor preta**

A cabeça, a fronte, a face, a nuca, a região triangular que se situa sob a mandíbula inferior em forma de gravata, e a coleira que separa a garganta do peito.

2. **São de Cor negra-ardósia-esverdeada**

O dorso, tectrizes, as coberteiras caudais, as rêmiges e a cauda.

3. **São de cor branca nos de Peito Branco**

O peito, o ventre, a garganta e o uropígio. Sendo que possuem uma raja em forma de “**Bigode Chinês**” que parte da base da mandíbula inferior em direção aos encontros das asas, possuindo ainda uma semi-orla orbital na parte inferior dos olhos.

4. **São de cor amarela nos de Peito Amarelo**

O peito, o ventre, a garganta e o uropígio.

5. **Olhos com Íris negras** e bico cinza azulado nos de Peito Amarelo com Tarsos Negros.

6. **Olhos com Íris negras** dotados de semi-orla orbital branca na parte inferior dos olhos, e bico branco acinzentado nos de Peito Branco com Tarsos Negros.

Obs: Alguns dos indivíduos deste grupo possuem um “Espelho Branco” no centro das azas, ou apenas os insinua, no entanto encontramos um grande número completamente desprovido de tal característica. (não as exibem).

AS FÊMEAS

São encontradas em três plumagens distintas, a saber:

1. Fêmea Clara

Fêmea “**Parda Olivácea clara**”, dotada de asas e cauda “**ardósia-esverdeada**” **escura**, sendo o peito, o ventre, e o uropígio “**Pardos Clara**” apresentando o centro do ventre de cor quase braça acinzentada.

2. Fêmea Escura

Fêmea “**Parda Olivácea escura**”, dotada de asas e cauda “**cinzento ardósia esverdeada quase negra**”, sendo o peito, o ventre, e o uropígio “**Pardos**”.

3. Fêmea Coleira

Fêmea “**Parda Olivácea escura**”, dotada de asas dorso e cauda “**cinzento ardósia esverdeada quase negro**”, sendo o peito dotado de uma leve coleira negra, (a coleira encontra-se apenas insinuada, esmaecida) o ventre, e os uropígios “**Pardos**”.

Gilson Barbosa.